



For Outdoor Use Around
the Home Only

Spectracide®



TRIAZICIDE® INSECT KILLER ONCE & DONE!™ CONCENTRATE

Insecticida concentrado

Kills on Contact		 ATTACH TO HOSE
Kills Above & Below Ground	Up to 2 Month Control <small>of Nuisance Pests</small>	

17-13003

Active Ingredient:
Gamma-Cyhalothrin 0.25%
Other Ingredients 99.75%

†For terms of guarantee, see back booklet.
*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

For lawns & landscapes

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back booklet for additional precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer las declaraciones preventivas adicionales.

Net 32 fl oz
(1 qt / 946 mL)

CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBEN ESPERAR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA (CONT.)	
HORTALIZAS (CONT.)	IPC
Maíz (dulce y para palomitas)	21
Frijol alado, Ejotes, Ejotes amarillos, Frijoles de carita, Chicharos de jardín, Chicharos verdes y Chicharos dulces	7
Lechuga (hojas y corazón)	1
IPC = Intervalo previo a la cosecha	

ÁRBOLES FRUTALES Y DE NUECES

Aplice cuando aparezcan los insectos o cuando ocurra daño. Rocíe para mojar todas las superficies de las plantas infestadas. Aplique como un rocío foliar completo. Moje las hojas y las ramas hasta que goteen. Trate de rociar la superficie inferior de las hojas y penetrar el follaje tupido. Con un cuarto de galón se tratan 19,200 pies cuadrados de árboles frutales y de nueces.

En árboles frutales no aplique más de nueve veces por año, y aplique sólo cinco veces después del florecimiento. En árboles de nueces no aplique más de seis veces por año, y aplique sólo cinco veces después del florecimiento.

Se usa en manzano, manzano silvestre, nispero, Mayhaw, peral asiático, peral y membrillo para controlar: saltarillas, polilla, palomilla de las yemas del manzano, cidia, grapholita prunivora, gusano verde del fruto, especies de lagartas (gusanos tenderos), minador punteado, mosca de la manzana (adulto), minador punteado, gorgojos plum curculio, escarabajo japonés, chinche, chinche hedionda, saltarilla, cigarras periódicas, áfido del manzano, áfido rosado del manzano, psilido del peral, Piojo de San José (sólo en frutos).

Se usa en chabacano, cerezo dulce, cerezo agrio, nectarina, durazno, ciruelo (Chickasaw, Damson, Japonés), ciruela (plumcot) y ciruelas pasa, para controlar: larvas de orugas, anarsia, cidia, polilla de los melocotoneros, gusano verde del fruto, lagartas (gusanos tenderos), American plum borer, mosca de la cereza adulta, gorgojos Plum curculio, rose chafer, escarabajo japonés, chinche, chinche hedionda, saltarillas, cigarras periódicas, áfido negro del cerezo.

Se usa en almendra, nuez de haya, nuez de Brasil (Brazil Nut), nuez de Cuba (Butternut), castaña, Chinquapin, avellana (hazelnut), nogal americano, macadamia, nogal (negro e inglés) y nuez pecana para controlar: larvas de orugas, gusano de la naranja, polilla, cydia (filbertworm), anarsia, mosca de la nuez (adulto), hormigas, chinche, chinche hedionda, chinches, insecto occidental de la semilla de la conifera (leaffooted bug), áfido del nogal, hickory shuckworm, barrenador de la nuez, pecan weevil, pulgón amarillo del pacanero, pecan spittlebug, filoxera del pacanero.

CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBEN ESPERAR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA	
ÁRBOLES FRUTALES Y DE NUECES	IPC
Manzano, Manzano silvestre, Nispero, Mayhaw, Peral asiático, Peral, Membrillo	21
Chabacano, Cerezo dulce, Cerezo agrio, Nectarina, Durazno, Ciruelo (Chickasaw, Damson Japonés), Ciruela y Ciruelas pasa	14
Almendra, Nuez de haya, nuez de Brasil (Brazil Nut), nuez de Cuba (Butternut), Castaña, Chinquapin, Avellana (hazelnut), Nogal americano, Macadamia, Nogal (negro e inglés) y Nuez pecana	14
IPC = Intervalo previo a la cosecha	

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego.

Si está vacío: No vuelva a utilizar el envase. Tirelo en la basura, u ofrézalo para reciclar, si existe esa opción.

Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano, para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno ni externo.

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.
ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA
ANTES DE USAR.

PEEL HERE
RESEALABLE LABEL

ABRA AQUÍ
ETIQUETA RESELLABLE

TRIAZICIDE® INSECT KILLER

— **ONCE & DONE!™** —

CONCENTRATE

Insectida concentrado



Long-Lasting Protection
from Insect Damage



Fast-Acting Formula



For Broadcast
and Barrier Use



Covers up to
16,000 sq ft of Lawn

PRODUCT FACTS

WHAT IT DOES:

Kills grubs, ants*, fleas, chinch bugs, mosquitoes, sod webworms, aphids, beetles, whiteflies, mites, deer ticks, Japanese beetles, European crane flies, fire ants and other listed insects.
*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

WHERE TO USE:

Outdoors

QUESTIONS & COMMENTS:

Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address at right, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

Dist. by Spectrum Group, Div. of United Industries Corp.
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-237-8845

EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 39754-WI-1 (R),

79533-WI-1 (BT), 39609-MO-1 (BM)

Circled letter is first letter of lot number.

17-13004 © 2008 UIC

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC

0 71121 10415 1

CÓMO USAR LA BOQUILLA READY SPRAY (PREPARADA PARA ROCIAR)

1. **Agite bien el envase antes de usar el producto.**
2. Conecte una manguera de jardín a la boquilla Ready Spray. Asegúrese de que el selector esté en la posición "OFF" (apagado) con la lengüeta de seguridad en la muesca de la válvula.
3. Abra el agua del grifo. Extienda la manguera hasta la zona más alejada que se vaya a tratar y retroceda hacia el grifo de manera de no entrar en contacto con el área tratada.
4. Para **COMENZAR** a rociar, dirija la boquilla hacia la zona a tratar y a.) doble hacia atrás la lengüeta de seguridad (ubicada a la derecha del selector) con su dedo pulgar y b.) sostenga mientras ajusta el selector en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga. El agua se mezclará automáticamente con el producto.
5. Rocíe hasta mojar para controlar insectos. Camine a ritmo regular mientras rocía con un movimiento de barrido, superponiendo ligeramente las áreas tratadas.
6. Para **DETENER** el rocío, gire **RÁPIDAMENTE** el selector en el sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta que se detenga y la lengüeta de seguridad se trabe en la muesca de la válvula. Cierre el agua del grifo. Para reducir la presión antes de quitar la boquilla de la manguera, doble hacia atrás la lengüeta de seguridad y gire el selector a la posición "ON" (encendido) hasta que el agua deje de salir como rocío.
7. Para **ALMACENAR** el producto sin usar, asegúrese de que el selector esté en la posición "OFF" (apagado) con la lengüeta de seguridad en la muesca de la válvula. Guarde en un lugar fresco, lejos del calor, la luz solar o el fuego.

NOTA: Este producto en general no mancha la mayoría de los revestimientos del hogar, dependiendo de la antigüedad y limpieza de los mismos. No obstante, antes de utilizarlo en áreas donde el rocío pueda entrar en contacto con el revestimiento del hogar (en particular con revestimientos vinílicos), pruébelo en un lugar que no sea muy visible y verifique su efecto unas horas más tarde. No lo utilice si observa manchas.

CÉSPEDES

INSECTOS QUE INFECTAN EL QUINCHADO/INSECTOS SUBTERRÁNEOS incluidos gorgojos de pasto azul anil (adultos), escarabajo negro del césped del género *Ataenius* (adulto), ácaros del género *Trombicula*, chinches, larvas blancas (escarabajo japonés, gusano blanco europeo, (European chaffer), escarabajo marrón (Southern chaffer)), escarabajos del estiércol y gorgojos (*Hyperodes* spp.) (adulto) y grillos topos (ninias y adultos jóvenes). Use un cuarto de galón de este producto para tratar 8,000 pies cuadrados de césped. Para el control de insectos subterráneos (grillos topos, larvas), riegue el área tratada con 1/4 a 1/2 pulgada más de agua para obtener óptimos resultados. No lo aplique más de siete veces por año por lugar.

INSECTOS DE SUPERFICIE, entre los que se incluyen hormigas*, gusanos soldados, cucarachas, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, gusanos de la familia *Pyralidae*, milpiés, mosquitos, cucaracha de caño, cochinitas de la humedad, ácaros, cigarrillas, garrapatas lone star, garrapatas americanas del perro, garrapatas de los venados (que pueden transmitir la enfermedad de Lyme), y chinches de agua. Use un cuarto de galón de este producto para tratar 16,000 pies cuadrados de césped. Humedezca el pasto completamente rociando con agua algunas horas antes de la aplicación. Para lograr el mejor control de los insectos de superficie no riegue más ni corte hasta después de transcurridas 24 horas de la aplicación. No lo aplique más de 14 veces por año por lugar.

CUÁNDO APLICAR EL TRATAMIENTO: Trate los siguientes insectos nocivos durante los meses indicados o cuando note su presencia.

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				Gorgojos			Larvas				
				Larvas del escarabajo del estiércol							
				Gorgojos (<i>Hyperodes</i> spp.)							
Trate las hormigas* y otros insectos cuando éstos aparezcan o cuando observe daños en el césped.											

*Argentinas, australes, de campo, "Allegheny Mound," carpinteras de la Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas.

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y FLORES ORNAMENTALES

Para usar en árboles, arbustos y flores ornamentales como por ejemplo: agerato, árbol de la vida, ciprés de Arizona, aster, azaleas, begonia, abedul, boj, arce, camelias, claveles, cerezo (ornamental), crisantemos, coleo, lisocapro, coníferas, abeto douglas, olmo, hiedra inglesa, evónimo, violeta persa, ficus benjamina, abeto, gladiolos, narcisos de olor, espino, acebo, madrelesva, hipocisto, hiedra, enebro, lirio, algarrobo, arce, caléndula, mimosa, jeringuilla, viburno, roble, orquídea, palma, pensamiento, caragana, petunia, filodendro, pino, ciruelo ornamental, nochebuena, álamo blanco o negro, tulipán, rododendro, rosas, boca de dragón, bolita de nieve, abeto, tejo, ficus benjamina, sauce, zinia. Para controlar hormigas*, gusanos soldados, oruga de las azaleas, áfidos, gusanos del saco, gorgojos de los invadidores (adultos), insectos del arce, gusanos de las yemas, oruga de California (*Phryganidia californica*), gusanos medidores (*Paleacrita vernata* y *Alsophila pometiaria*), cucarachas, grillos, gusanos cortadores, lagartas del este, escarabajo de la hoja del olmo, defoliadores de pinos, gusano telararero, crisomélidos, oruga del álamo lembiano, larvas de polilla gitana, escarabajos japoneses (adultos), escarabajos de junio (adultos), insectos de encaje, orugas que se alimentan de hojas, saltarillas, gusanos minadores (adultos), enrolladores de hojas, defoliadores, jejenes, larvas de *Syntomeida epilias*, cochinita, defoliador del pino, escarabajo de los brotes de pino, barrenador de los brotes del pino, chinches, gorgojos de la raíz, mosca barrenadora, cochinitas (etapa móvil), arañas, cigarrillas, escarabajos rayados, oruga rayada (*Anisota senatoria*), trips, barrenador de los brotes del pino, orugas peludas, ácaros blancos, cochinitas blandas, cochinita roja de California (etapa móvil), ácaros de trigo, cochinitas, cochinita blanca del pino (etapa móvil), ácaros telarareros, y moscas blancas.

*Argentinas, australes, de campo, "Allegheny mound," carpinteras de la Florida, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas.

Aplique como un rocío foliar completo. Moje las hojas y las ramas hasta que goteen. Trate de rociar la superficie interior de las hojas y penetrar el follaje tupido.

CONSEJOS SOBRE EL USO

- Para obtener mejores resultados, aplique antes de que las poblaciones de insectos sean grandes.
- Para obtener mejores resultados, aplique en ambos lados de las hojas y en todas las superficies de la planta donde haya insectos.
- Para el control de las cochinitas (scale), trate toda la planta, incluso el tallo, troncos y ramitas.
- Para el control de los gusanos del saco (bagworm), aplique cuando las larvas de los gusanos comiencen a salir.

HORTALIZAS

Aplique cuando aparezcan los insectos o cuando ocurra daño. Rocíe para mojar todas las superficies de las plantas infestadas. Aplique como un rocío foliar completo. Moje las hojas y las ramas hasta que goteen. Trate de rociar la superficie inferior de las hojas y penetrar el follaje tupido. Con un cuarto de galón se tratan 19,200 pies cuadrados de hortalizas.

No aplique al maíz más de 5 veces por temporada de cultivo. Para todos los demás cultivos, no aplique más de 9 veces por temporada de cultivo.

Se usa en brócoli, coles de Bruselas, col, brócoli cavalo, coliflor, brócoli chino, col China, mostaza parda y colinabo para controlar: gusano medidor de la alfalfa, falso medidor de la col, gusano importado de la col, gusano sureño de la col, gusano cortador, taladro del tallo, polilla de la col, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogollero, gusano piro, isoca del maíz, crisomélidos, escarabajo japonés (adulto), saltamontes, saltarilla, chinche, incluso chinche lygus, chinche hedionda, cigarrilla espumadora, áfido, mosca blanca, trips, ácaros telarareros.

Para usar en maíz (dulce y para palomitas) para controlar: gusano cortador, gusano cortador del frijol occidental, isoca del maíz, gusano verde del trébol, cigarrilla espumadora, gusano cogollero del tabaco, barrenador europeo del maíz, barrenador del maíz del suroeste, barrenador del tallo, barrenador (*Hydraecia immanis*), gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano de la raíz del maíz del oeste (adulto), gusano de la raíz del maíz del norte (adulto), gusano de la raíz del maíz del sur (adulto), gusano de la raíz del maíz de México (adulto), escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo de la hoja del cereal, escarabajo japonés (adulto), escarabajo (*Carpophilus lugubris*) (adulto), chinche hedionda, saltamontes, pulgón del maíz, pulgón de la espiga, chinches, chinche verde.

Solamente en maíz dulce: gusano soldado sureño, gusano cortador del frijol occidental, chinche lygus, cicadélidos, áfido, ácaros telarareros, mosca del maíz (adulto).

Para usar en cebolla (bulbo) y ajo para controlar: gusano cortador, gusano de la semilla del maíz (adulto), mosca de la cebolla (adulto), gusano minadores (adulto), gusano soldado, trips de la cebolla, trips del tabaco, trips occidental de las flores, trips de las flores, áfido, chinche, chinche hedionda.

Se usa en tomate, tomatillo, pimiento (morrón y otro pimiento dulce), berenjena, tomatillo rojo y pepino para controlar: falso medidor de la col, gusanos cortadores, gusano cornudo, gusano del fruto del tomate, gusano cogollero del tabaco, gusano alfiler, gusano soldado del betabel, gusano soldado sureño, gusano piro, gusano cogollero, barrenador europeo del maíz, gusano minador, escarabajo de la papa de Colorado, crisomélidos, saltamontes, saltarilla, áfido, mosca blanca, cigarrilla espumadora, chinche hedionda, chinche, barrenador del tallo, escarabajo apollador, escarabajo japonés (adulto), gorgojos del género *Litoderes*, escarabajo del pepino (adulto).

Para usar en frijol alado, ejotes, ejotes amarillos, frijoles de carita, chicharos de jardín, chicharos verdes y chicharos dulces para controlar: gusanos cortadores, gusano verde del trébol, gusano importado de la col, gusano peludo, Velvetleaf Caterpillar, conchuela del frijol, isoca del maíz, larvas de *Vanessa cardui*, barrenador europeo del maíz, orugas medidoras, gusano cortador del frijol occidental, gusano soldado, gusano piro, gusano piro del oeste, oruga defoliadora del frijol, especies de gusanos tejedores, orugas defoliadoras, mariposita amarilla de la alfalfa, barrenador del tallo, escarabajo del pepino (adulto), gusano de la raíz del maíz (adulto), crisomélidos (adulto), escarabajo apollador, escarabajo de la hoja del frijol, escarabajo japonés (adulto), saltarillas, especies del género *Halticus*, periquito tricornudo, cigarrilla espumadora, chinche hedionda, chinche, saltamontes, trips, áfido.

Para usar en la lechuga (corazón y hojas) para controlar: gusano medidor de la alfalfa, falso medidor de la col, gusano importado de la col, gusanos cortadores, gusano peludo, gusano verde del trébol, gusano soldado, gusano soldado del betabel, gusano cogollero, isoca del maíz, barrenador europeo del maíz, crisomélidos, escarabajo japonés (adulto), escarabajo de las verduras (adulto), saltamontes, saltarilla, chinche, chinche hedionda, cigarrilla espumadora.

CANTIDAD DE DÍAS QUE SE DEBEN ESPERAR ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

HORTALIZAS	IPC
Brócoli, Coles de Bruselas, Col, Brócoli cavalo, Coliflor, Brócoli chino, Col China, Mostaza parda, Colinabo, Lechuga (corazón y hojas)	1
Tomate, Tomatillo, Pimiento (morrón y otro pimiento dulce), Berenjena, Tomatillo rojo y Pepino	5
Cebolla (bulbo), Ajo	14

For use on Asparagus Beans, Snap Beans, Wax Beans, Black-Eyed Peas, Garden Peas, Green Peas and Sugar Snap Peas to control: **cutworm spp., green cloverworm, imported cabbageworm, saltmarsh caterpillar, velvetleaf caterpillar, Mexican bean beetle, corn earworm, painted lady butterfly (larvae), European corn borer, looper spp., western bean cutworm, armyworm, yellow-striped armyworm, western yellow-striped armyworm, bean leafskeltonizer, webworm spp., leaflier spp., alfalfa caterpillar, stalk borer, cucumber beetle (adult), corn rootworm beetle (adult), flea beetle (adult), blister beetle, bean leaf beetle, Japanese beetle (adult), leathopper spp., fleas hopper spp., three-cornered alfalfa hopper, meadow spittlebug, stink bug spp., plant bug spp., grasshopper, thrips spp., aphid spp.**

For use on Lettuce (Head and Leaf) to control: **alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, cutworm spp., saltmarsh caterpillar, green cloverworm, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, corn earworm, European corn borer, flea beetle spp., Japanese beetle (adult), vegetable beetle (adult), grasshopper, leathopper, plant bug, stink bug, meadow spittlebug.**

NUMBER OF DAYS TO WAIT BETWEEN THE LAST APPLICATION AND HARVEST	
VEGETABLES	PHI
Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cavalo Broccoli, Cauliflower, Chinese Broccoli, Chinese Cabbage, Chinese Mustard, Kohlrabi, Lettuce (head and leaf)	1
Tomato, Tomatillo, Peppers (bell and nonbell), Eggplant, Ground Cherry and Pepino	5
Onions (bulb), Garlic	14
Corn (sweet and pop)	21
Asparagus Beans, Snap Beans, Wax Beans, Black-Eyed Peas, Garden Peas, Green Peas and Sugar Snap Peas	7
Lettuce (leaf and head)	1
PHI = Pre-Harvest Interval	

FRUIT AND NUT TREES

Apply when insects appear or when damage occurs. Spray to wet all infested plant surfaces. Apply as a thorough foliar spray. Wet leaves and branches to the dripping point. Try to spray underside of leaves and penetrate dense foliage. One quart will treat 19,200 sq ft of fruit and nut trees.

For fruit trees do not apply more than nine times per year, and only apply five times after blooms have formed. For nut trees do not apply more than six times per year, and only apply five times after blooms have formed.

For use on Apple, Crabapple, Loquat, Mayhaw, Oriental Pear, Pear and Quince to control: **leathopper spp., codling moth, tufted apple budworm, Oriental fruit moth, lesser appleworm, green fruitworm, tent caterpillar spp., tentiform leaf miner spp., apple maggot (adult), pear sawfly, plum curculio, Japanese beetle, plant bug, stink bug, leathopper, periodical cicada, apple aphid, rosy apple aphid, pear psylla, San Jose scale (on fruit only).**

For use on Apricot, Sweet Cherry, Tart Cherry, Nectarine, Peach, Plum (Chickasaw, Damson, Japanese), Plumcot and Prune to control: **leafroller spp., peach twig borer, Oriental fruit moth, peachtree borer spp., green fruitworm, tent caterpillar spp., American plum borer, cherry fruit fly spp. (adult), plum curculio, rose chafer, Japanese beetle, plant bug, stink bug, leathopper spp., periodical cicada, black cherry aphid.**

For use on Almond, Beech Nut, Brazil Nut, Butternut, Cashew, Chestnut, Chinquapin, Filbert (Hazelnut), Hickory Nut, Macadamia Nut, Walnut (Black and English) and Pecan to control: **leafroller spp., navel orangeworm, codling moth, filbertworm, peach twig borer, walnut husk fly spp. (adult), ants, plant bug, stink bug, chinch bug, leaffooted bug, walnut aphid, hickory shuckworm, pecan casebearer spp., pecan weevil, pecan aphid spp., pecan spittlebug, pecan phylloxera spp.**

NUMBER OF DAYS TO WAIT BETWEEN THE LAST APPLICATION AND HARVEST	
FRUIT AND NUT TREES	PHI
Apple, Crabapple, Loquat, Mayhaw, Oriental Pear, Pear, Quince	21
Apricot, Sweet Cherry, Tart Cherry, Nectarine, Peach, Plum (Chickasaw, Damson, Japanese), Plumcot and Prune	14
Almond, Beech Nut, Brazil Nut, Butternut, Cashew, Chestnut, Chinquapin, Filbert (Hazelnut), Hickory Nut, Macadamia Nut, Walnut (Black and English) and Pecan	14
PHI = Pre-Harvest Interval	

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store in a cool dry area away from heat or open flame.

If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

FIRST AID • If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow.

Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to fish. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters. Do not apply directly to water. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.



No permita que los niños ni la mascotas entren en el área tratada hasta que se seque.

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar este producto en áreas de césped ubicadas a una distancia de hasta 100 pies de un pantano o de un arroyo que desemboque directamente en un pantano costero.

CÓMO APLICAR

Defina la magnitud de la tarea de rocío. Para céspedes, mida el área que se va a rociar. En árboles, arbustos y flores, aplique como un rocío que cubra por completo. Comience el tratamiento cuando aparezcan los insectos por primera vez. Las aplicaciones sólo se deben repetir como se indica para mantener el control. Aplique el producto como se indica. Recuerde, es importante que la cobertura sea completa. Asegúrese de seguir las limitaciones de uso para la hortaliza específica que esté tratando, incluso la cantidad de rocío que se puede aplicar, el intervalo entre tratamientos y los días que hay que esperar antes de cosechar.

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.



Do not allow children or pets into the treated area until dry.

In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or stream that drains directly into a coastal marsh.

HOW TO APPLY

Determine the size of the spraying job. For lawns, measure the area to be sprayed. For trees, shrubs and flowers, apply as a thorough cover spray. Begin treating when insects first appear. Applications should be repeated only as directed to maintain control. Apply as directed. Remember, thorough coverage is important. Be sure to follow the important use limitations for the specific vegetable you are treating, including the amount of spray that can be applied, the interval between treatments and the days to wait before harvest.

USING THE READY SPRAY NOZZLE

1. Shake container well before using.
2. Connect a garden hose to the Ready Spray nozzle. Make sure the dial on the nozzle is in the "OFF" position with the safety tab in the valve notch.
3. Turn on water at faucet. Extend hose to the farthest area to be treated and work back toward the faucet so you don't come in contact with the treated area.
4. To BEGIN spraying, point nozzle toward treatment site and a.) bend the safety tab back (located at right of dial) with your thumb and b.) hold while turning dial clockwise until it stops. Water will automatically mix with the product.
5. Spray until wet to control insects. Walk at a steady pace while spraying using an even sweeping motion, slightly overlapping treated areas.
6. To STOP spraying, QUICKLY turn the dial counterclockwise until it stops and the safety tab engages into the notch on the valve. Turn water off at faucet. To relieve pressure before removing nozzle from hose, bend the safety tab back and turn dial "ON" until water stops spraying.
7. To STORE unused product, make sure the dial is in the "OFF" position with safety tab in the valve notch. Place in cool area away from heat, sunlight or open flame.

NOTE: This product is non-staining to most home siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray may contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use if any staining is observed.

LAWNS

THATCH-INFESTING INSECTS/UNDERGROUND INSECTS including blue grass billbug (adult), black turfgrass *Ataenius* (adult), chiggers, chinch bugs, white grubs (Japanese beetle, European chafer, southern chafer), dung beetle and hyperodes weevils (adult) and mole crickets (nymphs and young adults). Use one quart of this product to treat 8,000 sq ft of lawn. For subsurface insect control (mole crickets, grubs), water treated area with additional ¼ to ½ inch of water for optimum results. Do not apply more than seven times per year per location.

SURFACE INSECTS including ants*, armyworms, cockroaches, crickets, cutworms, earwigs, fleas, lawn moths (sod webworms), millipedes, mosquitoes, palmetto bugs, sowbugs, mites, spittlebugs, lone star ticks, brown dog ticks, American dog ticks, deer ticks (which may transmit Lyme Disease) and waterbugs. Use one quart of this product to treat 16,000 sq ft of lawn. Thoroughly wet down grass a few hours before applying. Delay additional watering or mowing for 24 hours after application for optimum control of surface insects. Do not apply more than 14 times per year per location.

WHEN TO TREAT: Treat the following pests during the months indicated or when first noticed.

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
				Billbugs			Grubs				
				Dung beetle grubs							
			Hyperodes weevils								
Treat ants* and other insects when they first appear or you notice lawn damage.											

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

ORNAMENTAL TREES, SHRUBS AND FLOWERS

For use on ornamental trees, shrubs and flowers such as but not limited to: Ageratum, Arborvitae, Arizona Cypress, Aster, Azaleas, Begonia, Birch, Boxwood, Box Elder, Camellias, Carnations, Chery (ornamental), Chrysanthemums, Coleus, Common Ninebark, Conifers, Douglas Fir, Elm, English Ivy, Euonymus, Exacum, Weeping Fig, Fir, Gladioli, Gold Bells, Hawthorn, Holly, Honeysuckle, Hypoestes, Ivy, Juniper, Lilac, Locust, Maple, Marigold, Mimosa, Mock Orange, Nannyberry, Oak, Orchid, Palm, Pansy, Pea Shrub, Petunia, Philodendron, Pine, Ornamental Plum, Poinsettia, Poplar, Tulip Poplar, Rhododendron, Roses, Snapdragon, Snowberry, Spruce, Taxus, Weeping Fig, Willow, Zinnia.

To control ants*, armyworms, azalea caterpillar, aphids, bagworms, black vine weevil (adult), box elder bugs, budworms, California oakworm, cankerworms, cockroaches, crickets, cutworms, eastern tent caterpillar, elm leaf beetles, European sawfly, fall webworm, flea beetles, forest tent caterpillar, gypsy moth larvae, Japanese beetles (adults), June beetles (adults), lace bugs, leaf-feeding caterpillars, leafhoppers, leafminers (adults), leaf rollers, leaf skeletonizers, midges, oleander moth larvae, pillbug, pine sawfly, pine shoot beetles, pinetip moths, plant bugs, root weevil, sawfly, scale insects (crawlers), spiders, spittlebugs, striped beetles, striped oakworm, thrips, tip moth, tussock moth larvae, broadmites, brown softscale, California redscale (crawler), clover mites, mealybugs, pineneedle scale (crawler), spider mites and whiteflies.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance.

Apply as a thorough foliar spray. Wet leaves and branches to the dripping point. Try to spray underside of leaves and penetrate dense foliage.

USE TIPS

- For best results, apply early before insect populations are high.
- For scale control, treat entire plant, including stem, trunk and twigs.
- For bagworm control, apply when bagworm larvae begin to hatch.
- For best results, apply to both sides of plant leaves and all plant surfaces where insects are found.

VEGETABLES

Apply when insects appear or when damage occurs. Spray to wet all infested plant surfaces. Apply as a thorough foliar spray. Wet leaves and branches to the dripping point. Try to spray underside of leaves and penetrate dense foliage. One quart will treat 19,200 sq ft of vegetable plants.

Do not apply more than five times per growing season to corn. For all other crops, do not apply more than nine times per growing season.

For use on Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cavalo Broccoli, Cauliflower, Chinese Broccoli, Chinese Cabbage, Chinese Mustard and Kohlrabi to control: alfalfa looper, cabbage looper, imported cabbageworm, southern cabbageworm, cutworm, cabbage webworm, diamondback moth, armyworm, beet armyworm, fall armyworm, yellow-striped armyworm, corn earworm, flea beetle, Japanese beetle (adult), grasshopper, leafhopper, plant bug, including lygus bug, stink bug, meadow spittlebug, aphid, whitefly, thrips, spider mite.

For use on Corn (sweet and pop) to control: cutworm, western bean cutworm, corn earworm, green cloverworm, meadow spittlebug, tobacco budworm, European corn borer, southwestern corn borer, stalk borer, hop vine borer, armyworm, beet armyworm, western corn rootworm beetle (adult), northern corn rootworm beetle (adult), southern corn rootworm beetle (adult), Mexican corn rootworm beetle (adult), bean leaf beetle, cereal leaf beetle, Japanese beetle (adult), sap beetle (adult), stink bug, grasshopper, corn leaf aphid, English grain aphid, chinch bug, green bug.

Sweet Corn only: southern armyworm, western bean cutworm, tarnished plant bug, aster leafhopper, aphid, spider mite, corn silkfly (adult).

For use on Onion (bulb) and Garlic to control: cutworm, seedcorn maggot (adult), onion maggot (adult), leafminer (adult), armyworm, onion thrips, tobacco thrips, western flower thrips, flower thrips, aphid, plant bug, stink bug.

For Use on Tomato, Tomatillo, Peppers (bell and nonbell), Eggplant, Ground Cherry and Pepino to control: cabbage looper, cutworm spp., hornworm, tomato fruitworm, tobacco budworm, tomato pinworm, beet armyworm, southern armyworm, yellow-striped armyworm, fall armyworm, European corn borer, leafminer, Colorado potato beetle, flea beetle, grasshopper, leafhopper, aphid, whitefly, meadow spittlebug, stink bug, plant bug, stalk borer, blister beetle, Japanese beetle (adult), vegetable weevil, cucumber beetle (adult).

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

FIRST AID • If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to fish. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters. Do not apply directly to water. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCION. Nocivo si se ingiere. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco.

PRIMEROS AUXILIOS • Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es extremadamente tóxico para los peces. No contamine el agua cuando elimine las aguas de lavado del equipo. No aplique directamente al agua. El arrastre y el escurrimiento del producto desde las áreas tratadas pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas vecinas.

Este producto es extremadamente tóxico para las abejas que estén expuestas al tratamiento directo o a los residuos que queden en cultivos o malezas en flor. No aplique este producto ni permita que pase a los cultivos o malezas en flor en caso que haya abejas volando por la zona.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group

Division of United Industries Corporation

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-237-8845

EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U) 39754-WI-1 (R) 79533-WI-1 (BT) 39609-MO-1 (BM)

Circled letter is first letter of lot number. 17-13004 ©2008 UIC